

## 松くい虫ヘリコプター防除にご協力ください

さつき松原の松くい虫被害防止のため、ヘリコプターによる薬剤散布を実施します。さつき松原は、地域の環境保全はもとより、心のふるさととしてかけがえのない財産です。安全面に十分配慮し実施します。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

ヘリコプター 散布 (有人)	① 5月16日(月) 午前5時～午前8時30分	薬剤希釈倍率：40倍
	② 6月6日(月) 午前5時～午前8時30分	散布量：60L/ha
無人ヘリコプター 散布 (ﾗｼﾞｮﾝ)	① 5月14日(土) 午前5時～午前10時30分	薬剤希釈倍率：20倍
	② 6月11日(土) 午前5時～午前10時30分	散布量：30L/ha

- 実施した場合は、午前7時にサイレンが鳴ります。  
※無人ヘリコプター散布は、実施した場合でもサイレンは鳴りません。
- 風速5メートル以上(無人ヘリは3メートル以上)、または雨天の場合は順延します。
- 実施時間は、天候により多少前後する場合があります。

### 使用薬剤「エコワン3フロアブル」

有効成分：チアクロプリド…3%、人畜毒性：普通物、魚毒性：A類相当





### 散布実施にあたり下記の点にご注意ください


- ① 散布当日、散布後3日間は、松原内に立ち入らないようにしてください。また散布区域内や隣接地の野イチゴや木の実等、食べないようにしてください。
- ② 農産物、海産物、養魚池、養蜂箱、洗濯物等、薬剤が付着して困るものは、ビニールシートで覆うか屋内に入れておいてください。自動車等に薬剤が付着した場合は洗い流してください。
- ③ 散布区域隣接地での果樹、笹、野菜類等の収穫は、1週間程度控えてください。
- ④ 蚕への毒性がありますので、散布区域周辺の桑園から桑を採取する場合は、前日までに採取してください。
- ⑤ 万が一、目の痛み等薬剤散布が原因と思われる症状がみられた場合は、至急下記医療機関が最寄の医療機関にて診察を受け、福岡森林管理署または市農業振興課まで連絡をお願いします。

- 岬診療所 (TEL62-1009)    ○ 湊診療所 (TEL62-3050)

#### 【問い合わせ先】

- 福岡森林管理署業務課グループ (担当) 後藤  
TEL092-843-2100
- 宗像市農業振興課 (担当) 梶木、寺尾  
TEL36-0041

凡 例	
ヘリコプター散布区域	
無人ヘリコプター散布区域	
通行止 (午前5時～10時)	
一時交通規制	



# 松くい虫地上防除にご協力ください

松くい虫被害防止のため、下図の区域において地上からの薬剤散布を実施します。安全面に十分配慮し実施します。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

実施日	使用予定薬剤名
(国) 5月19日(木) 午前5時～午前8時30分	モリエートマイクロカプセル (クロチアニジンマイクロカプセル剤)
(市) 5月24日(火) 午前5時～正午	モリエートマイクロカプセル (クロチアニジンマイクロカプセル剤)

○雨天の場合は順延します。

使用薬剤：モリエートマイクロカプセル (200倍希釈)

有効成分クロチアニジン…7.5%、人畜毒性：普通物、魚毒性：A類相当

## 散布実施にあたり下記の点にご注意ください


- 1 散布当日は、林内に立ち入らないでください。また、散布区域内や隣接地の野イチゴ等は食べないようにしてください。
- 2 農作物、海産物、洗濯物等、薬剤が付着して困るものは、ビニールシートで覆うか屋内に入れておいてください。自動車へ薬剤が付着した場合、水で洗い流してください。
- 3 散布区域隣接地での果樹、笹、野菜類等の収穫は、1週間程度控えてください。
- 4 蚕への毒性がありますので、散布区域周辺の桑園から桑を採取する場合は、前日までに採取してください。
- 5 万が一、目の痛み等薬剤散布が原因と思われる症状がみられた場合は、至急下記診療所か最寄の医療機関にて診察を受け、福岡森林管理署または市農業振興課まで連絡をお願いします。

○岬診療所 (TEL62-1009)    ○湊診療所 (TEL62-3050)


## 【問い合わせ先】

福岡森林管理署業務グループ (担当：後藤) TEL092-843-2100


宗像市農業振興課 (担当：梶木、寺尾) TEL36-0041



【神原区(市)】 ※太枠内…散布区域



【神湊(国)】 ※太枠内…散布区域



京泊東、京泊西、誠川区(市) ※太枠内…散布区域

平成28年4月27日

## 松くい虫地上防除にご協力ください

松くい虫被害防止のため、下図の区域において地上からの薬剤散布を実施します。安全面に十分配慮し実施します。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

実施日	使用予定薬剤名
(県) 5月16日(月) 午前5時～午前8時	スミバインMC (MEPマイクロプロセ剂)

○雨天の場合は、5月23日(月)・30日に延期します。

使用薬剤：スミバインMC (50倍希釈)

有効成分フェニトリン…23.5%、人畜毒性：普通物、魚毒性：B類相当

### 散布実施にあたり下記の点にご注意ください

- 1 散布当日は、林内に立ち入らないでください。また、散布区域内や隣接地の野イチゴ等は食べないようにしてください。
- 2 農作物、海産物、洗濯物等、薬剤が付着して困るものは、ビニールシートで覆うか屋内に入れておいてください。自動車へ薬剤が付着した場合、水で洗い流してください。
- 3 散布区域隣接地での果樹、笹、野菜類等の収穫は、1週間程度控えてください。
- 4 蚕への毒性がありますので、散布区域周辺の桑園から桑を採取する場合は、前日までに採取してください。
- 5 万が一、目の痛み等薬剤散布が原因と思われる症状がみられた場合は、至急下記医療機関か最寄の医療機関にて診察を受け、福岡県少年自然の家「玄海の家」まで連絡をお願いします。

○岬診療所 (TEL62-1009)    ○湊診療所 (TEL62-3050)

【問い合わせ先】

福岡県立少年自然の家 (担当：藤木)    TEL62-2511

